

Ασκήσεις - 9ο Φυλλάδιο

Ορισμός. Έστω V ένας διαν. χώρος και W_1 ένας υπόχωρος του V . Μια απεικόνιση $T : V \rightarrow V$ λέγεται *προβολή στον W_1* αν:

- (α) Υπάρχει υπόχωρος W_2 τ.ω. $V = W_1 \oplus W_2$.
- (β) Αν $x = x_1 + x_2$, όπου $x_1 \in W_1$ και $x_2 \in W_2$, τότε $T(x) = x_1$.

Στις ασκήσεις 1, 2 και 3, που ακολουθούν, θεωρήστε ότι ισχύει ο συμβολισμός του ορισμού.

1. Αποδείξτε ότι η προβολή T είναι γραμμική και ότι $W_1 = \{x : T(x) = x\}$.
2. Έστω V δ.χ., W_1 υπόχωρος του V και $T : V \rightarrow V$ προβολή στον W_1 . Αποδείξτε ότι $W_1 = \text{im}(T)$ και $W_2 = \ker(T)$.
3. Έστω V δ.χ., W_1 υπόχωρος του V και $T : V \rightarrow V$ προβολή στον W_1 . Αποδείξτε ότι $T^2 = T$.
4. Αποδείξτε ότι αν V είναι δ.χ. και $T : V \rightarrow V$ γραμμική με $T^2 = T$, τότε η T είναι προβολή στον υπόχωρο $W_1 = \text{im}(T)$.
5. Έστω V ένας χώρος εσωτερικού γινομένου και W υπόχωρος πεπερασμένης διάστασης του V . Αποδείξτε ότι αν η T είναι ορθογώνια προβολή στον W , τότε η $I - T$ είναι ορθογώνια προβολή στον W^\perp .
6. Έστω V ένας χώρος εσωτερικού γινομένου πεπερασμένης διάστασης και $T : V \rightarrow V$ προβολή. Δείξτε ότι αν η T είναι ορθογώνια προβολή, τότε $\|T(x)\| \leq \|x\|$, $\forall x \in V$.
Δώστε ένα παράδειγμα μιας προβολής T για την οποία η ανισότητα αυτή δεν ισχύει.
7. Έστω V ένας χώρος εσωτερικού γινομένου και $T : V \rightarrow V$ ορθογώνια προβολή. Δείξτε ότι:
 $\|T(x)\| = \|x\| \iff x \in \text{im}(T)$.
8. Έστω V ένας χώρος εσωτερικού γινομένου και $T \in \mathcal{L}(V)$. Αποδείξτε ότι ο T είναι κανονικός αν και μόνον αν $\|T(x)\| = \|T^*(x)\|$, $\forall x \in V$.
9. Θεωρήστε το χώρο $V = \mathbb{P}_2(\mathbb{R})$ με εσωτερικό γινόμενο

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x)q(x) dx.$$

Ορίζουμε $T : V \rightarrow V$ με $T(a_0 + a_1x + a_2x^2) = a_1x$.

α) Αποδείξτε ότι ο T δεν είναι αυτοσυζυγής.

β) Βρείτε τον πίνακα $\mathcal{M}(T; \mathcal{B})$, ως προς τη βάση $\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}$ και ελέγξτε αν είναι αυτοσυζυγής.

10. Έστω V ένας μιγαδικός χώρος εσωτερικού γινομένου πεπερασμένης διάστασης και $T \in \mathcal{L}(V)$ κανονικός. Αποδείξτε ότι:
- α) Ο T είναι προβολή αν και μόνον αν κάθε ιδιοτιμή του T είναι 1 ή 0.
- β) $T^* = -T$ αν και μόνον αν κάθε ιδιοτιμή του T είναι φανταστικός αριθμός.
11. Έστω V ένας χώρος εσωτερικού γινομένου πεπερασμένης διάστασης και $L : V \rightarrow V$ ένας αυτοσυζυγής τελεστής. Αποδείξτε ότι αν $\langle x, L(x) \rangle = 0$ για κάθε $x \in V$, τότε $L = T_0$, όπου T_0 ο μηδενικός τελεστής.
12. Έστω V ένας χώρος εσωτερικού γινομένου πεπερασμένης διάστασης και $T \in \mathcal{L}(V)$. Αποδείξτε ότι $T^*T = TT^* = I$ αν και μόνον αν $\|T(x)\| = \|x\|$, για κάθε $x \in V$.
13. Έστω V ένας πραγματικός χώρος εσωτερικού γινομένου πεπερασμένης διάστασης και $T \in \mathcal{L}(V)$. Αποδείξτε ότι ο V έχει μια ορθοκανονική βάση από ιδιοδιανύσματα του T με αντίστοιχες ιδιοτιμές που έχουν απόλυτη τιμή 1, αν και μόνον αν ο T είναι αυτοσυζυγής και $\|T(x)\| = \|x\|$, για κάθε $x \in V$.
14. Έστω A ένας μιγαδικός κανονικός ή πραγματικός συμμετρικός $n \times n$ πίνακας με ιδιοτιμές $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (όχι κατ' ανάγκην διακεκριμένες). Αποδείξτε ότι $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$ και $\text{tr}(A^*A) = \sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2$.
15. Έστω V ο χώρος των συνεχών συναρτήσεων με μιγαδικές τιμές στο $[0,1]$ και εσωτερικό γινόμενο $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)\overline{g(t)} dt$. Έστω $h \in V$, και ορίζουμε $T : V \rightarrow V$ με $T(f) = hf$. Αποδείξτε ότι ο τελεστής T είναι ορθομοναδιαίος (δηλ. $T^*T = TT^* = I$) αν και μόνον αν $|h(t)| = 1$, για $t \in [0, 1]$.
16. Έστω $V = C([-1, 1])$ και θεωρήστε τον τελεστή $P : V \rightarrow V$ με

$$(Pf)(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}.$$

Αποδείξτε ότι ο P είναι γραμμικός και ότι είναι προβολή.